

# KORELASI hs-CRP DAN KEBERADAAN Staphylococcus aureus PADA LUKA GANGREN DIABETES MELLITUS TIPE II

*by Perpustakaan IIK Bhakti Wiyata*

---

**Submission date:** 04-Mar-2025 10:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2501116722

**File name:** phylococcus\_aureus\_sister\_Juni\_2024\_-\_Binti\_Mu\_arofah\_Kediri.pdf (572.3K)

**Word count:** 2824

**Character count:** 18068



## KORELASI hs-CRP DAN KEBERADAAN *Staphylococcus aureus* PADA LUKA GANGREN DIABETES MELLITUS TIPE II

Sri Wahyuni<sup>1\*</sup>, Fathul Hidayatul Hasanah<sup>2</sup>, Binti Mu'arofah<sup>3</sup>,  
& Verdyan Taufan Rizky Jefer<sup>1,4</sup>

<sup>1,2,&4</sup>Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi dan  
Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Jalan  
K. H. Wahid Hasyim Nomor 65, Kediri, Jawa Timur 64114, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi dan Manajemen  
Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Jalan K. H. Wahid Hasyim  
Nomor 65, Kediri, Jawa Timur 64114, Indonesia

\*Email: [sri.wahyuni.ssi@iik.ac.id](mailto:sri.wahyuni.ssi@iik.ac.id)

Submit: 05-06-2024; Revised: 11-06-2024; Accepted: 16-06-2024; Published: 30-06-2024

18

**ABSTRAK:** Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu penyakit terjadinya gangguan metabolismik disertai dengan adanya peningkatan glukosa dalam darah atau disebut hiperglikemia. Diabetes bisa disebabkan karena gangguan pancreas tidak bisa memproduksi insulin, sekresi insulin kurang, kerja insulin yang tidak sempurna, ataupun keduanya. Ketika glukosa darah dalam kondisi meingkatkan dibiarkan dalam waktu panjang bisa menyebabkan komplikasi salah santunya seperti gangrene. Gangren diabetik merupakan salah satu komplikasi disebabkan karena kerusakan jaringan. Terjadinya gangren disebabkan adanya neuropati dan gangguan vaskuler yang biasanya pada area perifer tubuh. Pada luka diabetik terdapat bakteri yang bisa memperparah kondisi luka. Bakteri tersebut menghasilkan biofilm seperti *Staphylococcus aureus*. *Staphylococcus aureus* dapat melepaskan eksotoxin seperti leukosidin. Leukosidin melisikkan PMN dan melepaskan ROS selanjutnya akan menginduksi respon sitokin seperti interleukin-6 yang akan meningkatkan kadar hs-CRP. hs-CRP merupakan pengukuran CRP dengan presisi tinggi bahkan pada konsentrasi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kadar hs-CRP dan keberadaan *Staphylococcus aureus* pada luka gangren diabetes mellitus tipe II. Desain penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional dan pengambilan sampel secara accidental. Responden penelitian berjumlah 16 dengan kadar hs-CRP 15 responden naikngkat dan terdapat 9 responden dengan bakteri *Staphylococcus aureus*. Uji korelasi dengan nilai  $p = <0.05$  ( $p=0.032$ ) inya terdapat korelasi antara hs-CRP dan keberadaan *Staphylococcus aureus* pada luka gangren diabetes mellitus tipe II.

**Kata Kunci:** Diabetes Mellitus, hs-CRP, *Staphylococcus aureus*.

6

**ABSTRACT:** Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder that is accompanied by increased glucose in the blood or called hyperglycemia. Diabetes can be caused by problems with the pancreas not being able to produce insulin, insufficient insulin secretion, imperfect insulin action, or both. When blood glucose is left elevated for a long time, it can cause complications such as gangrene. Diabetic gangrene is one of the complications caused by tissue damage. Gangrene occurs due to neuropathy and vascular disorders, usually in the peripheral areas of the body. Bacteria found in diabetic wounds are bacteria that produce biofilms such as *Staphylococcus aureus*. *Staphylococcus aureus* can release exotoxins such as leukocidin. Leucocidin lyses PMNs and releases ROS which will then induce a cytokine response such as interleukin-6 which will increase CRP levels. hs-CRP is a high precision CRP measurement even at low concentrations. This study aims to determine the correlation between hs-CRP levels and the presence of *Staphylococcus aureus* in type II diabetes mellitus gangrene wounds. The research design used is observational analytical using a cross sectional approach and accidental sampling. There were 16 research respondents with increased hs-CRP levels in 15 respondents and 9 respondents with *Staphylococcus aureus* bacteria. Correlation test with a value of  $p = <0.05$  ( $p=0.032$ ) means that there is a correlation between hs-CRP and the presence of *Staphylococcus aureus* in type II diabetes mellitus gangrene wounds.

**Keywords:** Diabetes Mellitus, hs-CRP, *Staphylococcus aureus*.

Uniform Resource Locator: <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/bioscientist>



**How to Cite:** Wahyuni, S., Hasanah, F. H., Mu'arofah, B., & Jeferson, V. T. R. (2024). Korelasi hs-CRP dan Keberadaan *Staphylococcus aureus* pada Luka Gangren Diabetes Mellitus Tipe II. *Bioscientist* : *Jurnal Ilmiah Biologi*, 12(1), 1126-1132.  
<https://doi.org/10.33394/bioscientist.v12i1.11796>



**Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi** is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

7

## PENDAHULUAN

Diabetes mellitus atau sering disebut DM adalah suatu kondisi dimana terjadi gangguan metabolisme dengan ditandai hiperglikemia. Hal tersebut disebabkan karena rusaknya pangkreas sehingga tidak dapat memproduksi insulin, gangguan sekresi insulin, kerja insulin yang tidak sempurna, ataupun keduanya. Hiperglikemia kronis dalam jangka panjang pada diabetes dikaitkan dengan komplikasi mikrovaskuler yang bisa menebakkan koplikasi pada mata, ginjal, saraf dan banyak lagi (Punthakee *et al.*, 2018). Dilihat dari *World Health Organization* (WHO) penderita penyakit diabetes mellitus mencapai 422 juta orang di dunia. Angka tersebut diprediksi terus mengalami peningkat hingga 600 juta penderita di tahun 2035. WHO juga memperkirakan terdapat 2,2 juta kejadian kematian sebelum usia 70 tahun karena diabetes (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan *International Diabetes Federation* (IDF) menyebutkan di Indonesia tahun 2021 penderita diabetes yaitu sebanyak 19,4 juta dan prediksi meningkat hingga mencapai 28 juta penderita tahun 2045 (International Diabetes Federation, 2021).

Persentase penderita gangrene diabetik di Indonesia sekitar 15 % dari penderita diabetes. Studi epidemiologi yang dilakukan menyebutkan >1 juta kasus kejadian amputasi setiap tahun disebabkan akibat diabetes mellitus (Kartika, 2017). Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, jumlah penderita diabetes di Kabupaten Jombang sebanyak 37.120 orang (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2021). Sedangkan data rekam medis RSK Mojowarno Jombang terdapat 110 pasien *Diabetes mellitus* tipe II dengan gangren selama bulan September-November 2023.

Gangren diabetik merupakan kondisi terjadi kerusakan jaringan karena adanya gangguan pada syarat atau neuropati dan terjadinya gangguan vaskuler yang biasanya pada area perifer tubuh (Rosa *et al.*, 2019). Timbul gangren akibat adanya trauma seperti tekanan, panas, bahan kimia, atau pukulan benda tajam. Gangren juga dapat timbul sebagai akibat dari terjadi infeksi pada penderita diabetes (Dzatudzaka, 2019).

Infeksi pada luka gangren dapat menyebabkan bakteri dapat masuk ke dalam darah. Bakteri yang terdapat pada luka diabetik diantaranya seperti *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, dan *Klebsiella* sp. Bakteri-bakteri tersebut merupakan bakteri yang menghasilkan biofilm (Anshori *et al.*, 2014).

*Staphylococcus aureus* suatu bakteri dengan bentuk coccus besifat Gram positif yang bisa melepaskan eksotoksin, dapat melisiskan sel dalam darah seperti hemolisin, leukosidin, dan leukotoksin. Toksin tersebut dapat menghancurkan membran dari sel eukariotik. Toksin leukosidin dapat membentuk membran pori yang bisa membuat rusaknya sel. Selanjutnya melisiskan sek yaitu *Polymorphonuclear Neutrophils*. Kemudian dilepaskannya *Reactive Oxygen*




*Species.* Setelah terjadi penurunan daya tahan tubuh akan meningkatkan perkembangbiakan bakteri *Staphylococcus aureus* akibat glukosa berlebih dalam darah (Utaminingsih, 2015). Keberadaan *Staphylococcus aureus* dalam darah akan menginduksi respon sitokin seperti interleukin-6 (IL-6). IL-6 akan mengatur sintesis protein fase akut, CRP pada sel hepatosit (Ansar & Ghosh, 2013).

Keadaan hiperglikemia juga dapat menyebabkan terjadinya mitokondria <sup>20</sup>ak dan bisa terjadinya peningkatan ROS. Peningkatan ROS akan terjadinya kerusakan makrovaskuler dan mikrovaskuler. Proses terjadinya kerusakan jaringan tubuh diantaranya jalur biokimia yaitu *aldose reductase*, stres oksidatif, dan lewat pleiotropik *Protein Kinase C* (PKC). Meningkatnya PKC juga menstimulasi terjadi aktivitas *Nuclear Factor Kappa Beta* dalam tubuh. Selanjutnya akan mengaktifkan sitokin pro inflamasi dalam tubuh seperti TNF- $\alpha$ , Interleukin-1 $\beta$ , Interleukin-8 dan Interleukin-6 yang selanjutnya IL-6 akan menstimulus terjadinya sintesis *C-Reactive Protein* (CRP) (Kalma, 2018).

CRP adalah suatu protein diproduksi di hati yang digunakan sebagai penanda inflamasi tidak spesifik. Terjadinya peningkatan CRP digunakan dalam mengamati terjadinya inflamasi secara non spesifik terhadap penyakit (Sipahutar, 2020). Dengan kemajuan teknologi, adanya metode pengukuran yang mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap CRP yaitu *High Sensitivity C-Reactive Protein* (hs-CRP) (Seo & Shin, 2021). Hs-CRP merupakan pengukuran CRP dengan presisi tinggi dan bahkan bisa mendeteksi dalam konsentrasi rendah. Pada hs-CRP kadar  $<1$  juga bisa terdeteksi (Burhanuddin *et al.*, 2021). Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan peneliti ingin mengetahui korelasi hs-CRP dengan keberadaan *Staphylococcus aureus* pada luka gangren penderita DM tipe II.

## METODE 3

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional dengan <sup>23</sup>enggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi yang digunakan adalah semua penderita diabetes mellitus tipe II dengan luka gangren di RSK Mojowarno Jombang. Pengambilan sampel yang digunakan teknik *accidental* yaitu sampel yang kebetulan ada tersedia pada waktu yang ditentukan pada 26 Februari-26 Maret 2024. Tahapan penelitian bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Penelitian.



Spesimen untuk pemeriksaan hs-CRP yaitu *whole blood* dan diperiksa menggunakan alat Biotime BIOT-Y6-1 dengan metode *Fluorescence Immunoassay* (FIA). Sedangkan identifikasi *Staphylococcus aureus* dengan melakukan swab pada luka tersebut dan dimasukkan menggunakan media transport amies. Kemudian ditanam ke media Manitol Salt Agar (MSA). Setelah inkubasi 24 jam 37°C dilakukan observasi, pewarnaan Gram, uji katalase dan uji koagulase. Semua data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa *statistic SPSS* dengan uji korelasi *Spearman rank*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dengan cara dan waktu yang sudah ditetapkan didapatkan 16 responden diabetes dengan luka gangren. Frekuensi jumlah penderita diabetes perempuan lebih banyak dari responden laki-laki, seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan (tabel 2) rata-rata kadar hs-CRP 4.69 mg/dl. Hal tersebut menunjukkan kadar hs-CRP menunjukkan peningkatan. Untuk nilai hs-CRP >1 artinya terjadi peningkatan hs-CRP. Identifikasi bakteri dari 16 responden penderita biabetes dengan luka gangrene terdapat 9 responden dengan bakteri *Staphylococcus aureus* (tabel 3). Selanjutnya dilanjutkan analisa korelasi (tabel 4) diketahui terdapat korelasi antara hs-CRP dan Keberadaan *Staphylococcus aureus* dengan nilai sig = 0,032 (<0.05) dengan tingkat korelasi sedang.

Tabel 1. Frekuensi dan Persentase Responden.

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Laki-laki	5	31.25%
Perempuan	11	68.75%

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan hs-CRP.

Mean	Peningkatan hs-CRP	Normal hs-CRP
4.69	15 responden	1 responden

Tabel 3. Hasil Identifikasi Bakteri.

<i>Staphylococcus aureus</i>	Frekuensi	Persentase
Ada	9	56 %
Tidak ada	7	44%

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi.

Correlation Coefficient	Sig.	N
-,538	,032	16

Penderita diabetes mellitus berdasarkan karakteristik jenis kelamin didapatkan perempuan lebih banyak menderita diabetes dibanding kejadian pada laki-laki. Berdasarkan tingkat aktivitas, pada perempuan cenderung lebih rendah aktivitasnya dari laki-laki yang memungkinkan lebih bisa terjadi penumpukan glukosa dalam darah dan menyebabkan komplikasi dengan luka gangren (Awaluddin *et al.*, 2023). Pada perempuan hormon juga mempengaruhi terjadinya resistensi insulin. Apalagi setelah perempuan menopause, penurunan hormon estrogen dan progesteron juga menurunkan kemampuan respon insulin juga akan menurun (Meidikayanti & Wahyuni, 2017). Setelah terjadi penurunan respon insulin



akan akan mendorong distribusi timbunan lemak dan akan meningkatkan indeks massa tubuh (Bullard *et al.*, 2018).

Diabetes mellitus tanpa pengelolaan yang baik atau dalam keadaan tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadi komplikasi salahsatunya timbulnya gangren. Penderita penderita DM memiliki resiko tinggi untuk mengalami gangren. Hal tersebut dikarenakan pada DM rentan terkena infeksi yang diakibatkan oleh bakteri yang perkembangbiakannya berkaitan dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah (Jannah & Safnowandi, 2018; Rosa *et al.*, 2019). Di sini peningkatan kadar dari CRP menandakan adanya inflamasi, trauma, maupun infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Sedangkan hs-CRP bisa digunakan untuk membantu mengukur inflamasi sistemik meskipun dalam tingkat rendah (Kalma, 2018).

*Staphylococcus aureus* merupakan <sup>22</sup> suatu bakteri berbentuk coccus bersifat Gram positif dan salah satu dari bakteri yang paling banyak ditemukan pada luka gangren. Adanya bakteri *Staphylococcus aureus* pada luka gangren dapat memperburuk kondisi luka. Bakteri ini memiliki kemampuan masuk kedalam darah yang akan melepaskan eksotoksin seperti leukositidin dan *Phenol Soluble Modulins* yang dapat menghancurkan leukosit (Gaol *et al.*, 2017).

Setelah di uji korelasi yaitu terdapat korelasi antara hs-CRP dan keberadaan *Staphylococcus aureus* pada DM tipe II dengan luka gangren. Kadar hs-CRP ada yang mengalami peningkatan dan ada 1 responden dengan kadar normal. Peningkatan tersebut menandakan adanya inflamasi didalam tubuh. Sedangkan hasil identifikasi *Staphylococcus aureus* terdapat 9 responden dengan bakteri *Staphylococcus aureus*. Peningkatan kadar hs-CRP dapat terjadi akibat adanya komplikasi seperti gangrene, penanda komplikasi lain seperti jantung, ginjal atau lainnya (Kalma, 2018). Sedangkan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri penghasil biofilm yang terdapat pada luka gangren yang dapat memperburuk luka gangren dengan cara melisikan leukosit melalui pelepasan leukositidin. Ditemukan peningkatan hs-CRP dan *Staphylococcus aureus* bisa membantu mengarahkan dengan terapi apa yang dilakukan selanjutnya (Ekawati *et al.*, 2018). Penelitian ini terdapat keterbatasan seperti jumlah sampel minimal dan peneliti tidak mengetahui terapi yang dijalani oleh responden.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yaitu adanya korelasi antara Hs-CRP dan keberadaan *Staphylococcus aureus* pada luka gangren diabetes mellitus tipe II. Peningkatan kadar hs-CRP mengindikasikan adanya inflamasi yang terjadi akibat bakteri *Staphylococcus aureus*.

## SARAN

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan obat yang dikonsumsi dan menambah parameter pemeriksaan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada perawat dan laborat RSK Mojowarno Jombang, Dosen Teknologi Laboratorium Medis Institusi Ilmu



Kesehatan BHAKTA yang telah membantu selama penelitian. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan Institusi Ilmu Kesehatan BHAKTA Kediri yang mendukung penelitian ini.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ansar, W., & Ghosh, S. (2013). C-reactive protein and the biology of disease. *Immunologic Research*, 56(1), 131–142. <https://doi.org/10.1007/s12026-013-8384-0>
- Anshori, N. H. Al, Widayati, N., & Nurdiana, A. (2014). Pengaruh Perawatan Luka Menggunakan Madu terhadap Kolonisasi Bakteri *Staphylococcus Aureus* pada Luka Diabetik Pasien Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 2(3), 500–506.
- Awaluddin, A. I., & Nusdin. (2023). Factors Associated with the Incidence of Diabetic Ulcers among Diabetes Mellitus Patients at Labuang Baji Hospital Makassar. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 6(2), 79–87. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v6i2.665>
- Bullard, K. M., Cowie, C. C., Lessem, S. E., Saydah, S. H., Menke, A., Geiss, L. S., Orchard, T. J., Rolka, D. B., & Imperatore, G. (2018). Prevalence of Diagnosed Diabetes in Adults by Diabetes Type — United States, 2016. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 67(12), 359–361. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6712a2>
- Burhanuddin, Y. E., Syahrianti, S., & Afrianty, I. (2021). Perbedaan Kadar Interleukin 6 Serum dan Kadar HsCrp Pada Ibu Hamil Preeklampsia. *Window of Health : Jurnal Kesehatan*, 4(3), 204–209. <https://doi.org/10.33096/woh.v4i03.210>
- Dinas Kesehatan Jawa Timur. (2021). *Profil Kesehatan 2021*.
- Dzatudzaka, A. E. H. (2019). *Konseling Efektif Sebagai Upaya Preventif Gangren pada Penderita Diabetes Mellitus di RSUD Gambiran Kota Kediri*. [Universitas Sebelas Maret]. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jgn3b>
- Ekawati, E. R., Nur Husnul, S. Y., & Herawati, D. (2018). IDENTIFIKASI KUMAN PADA PUS DARI LUCA INFEKSI KULIT. *Jurnal SainHealth*, 2(1), 31–35. <https://doi.org/10.51804/jsh.v2i1.174.31-35>
- Gaoi, Y. E. L., Erly, E., & Sy, E. (2017). Pola Resistensi Bakteri Aerob pada Ulkus Diabetik Terhadap Beberapa Antibiotika di Laboratorium Mikrobiologi RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2011 - 2013. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(1), 164–170. <https://doi.org/10.25077/jka.v6i1.664>
- International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas* (10th ed.). Brusells: International Diabetes Federation. <https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/>
- Jannah, H., & Safnowandi, S. (2018). Identifikasi Jenis Tumbuhan Obat Tradisional di Kawasan Hutan Olat Cabe Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 6(2), 145–172. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v6i2.2457>
- Kalma. (2018). STUDI KADAR C-REACTIVE PROTEIN (CRP) PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2. *Jurnal Media Analis Kesehatan*, 1(1), 62–68. <https://doi.org/10.32382/mak.v1i1.222>



- Kartika, R. W. (2017). Pengelolaan Gangren Kaki Diabetik. *Cermin Dunia Kedokteran*-248, 44(1), 18–22. <https://doi.org/10.55175/cdk.v44i1.810>
- Kemenkes RI. (2018). *InfoDATIN2018*.
- Meidikayanti, W., & Wahyuni, C. U. (2017). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS PADEMAWU. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(2), 240–242. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i2.2017.240-252>
- Punthakee, Z., Goldenberg, R., & Katz, P. (2018). Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes, Prediabetes and Metabolic Syndrome. *Canadian Journal of Diabetes*, 42, S10–S15. <https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2017.10.003>
- Rosa, S. K. Dela, Udyiyono, A., Kusariana, N., & Saraswati, L. D. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Timbulnya Gangren pada Pasien Diabetes Mellitus di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 192–202. <https://doi.org/10.14710/jkm.v7i1.22869>
- Seo, Y.-H., & Shin, H.-Y. (2021). Relationship between hs-CRP and HbA1c in Diabetes Mellitus Patients: 2015–2017 Korean National Health and Nutrition Examination Survey. *Chonnam Medical Journal*, 57(1), 62–68. <https://doi.org/10.4068/cmj.2021.57.1.62>
- Utaminingsih, B. V. M. (2015). Pengaruh Pemberian Minyak Nigella Sativa dan Kombinasinya dengan Seftriakson Terhadap Jumlah Kuman Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) pada Kultur Otak Mencit BABL/c. *Karya Tulis Ilmiah*. Universitas Diponegoro Semarang.

# KORELASI hs-CRP DAN KEBERADAAN Staphylococcus aureus PADA LUKA GANGREN DIABETES MELLITUS TIPE II

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | jurnal.iik.ac.id<br>Internet Source   | 2%  |
| 2 | Mukhlis Rohmadi, Nurul Septiana.<br>"Pengembangan Majalah Fisika Pada Materi Usaha dan Energi Terintegrasi Islam", JIPFRI (Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah), 2023<br>Publication  | 2%  |
| 3 | repository.ung.ac.id<br>Internet Source   | 1%  |
| 4 | repository.unsoed.ac.id<br>Internet Source  | 1%  |
| 5 | Rudina Azimata Rosyidah, Aulia Tata Ningrum, Widia Rahmatullah. "PERBEDAAN JUMLAH LEUKOSIT PADA DARAH EDTA SEGAR DAN DARAH EDTA YANG DITUNDA SELAMA 2 JAM", Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences), 2024<br>Publication | 1%  |
| 6 | www.revistaestima.com.br<br>Internet Source   | 1%  |
| 7 | doaj.org<br>Internet Source   | <1% |

8	Internet Source	<1 %
9	proceeding.unindra.ac.id Internet Source	<1 %
10	Betti Sri Wahyuni, Ruswanti Ruswanti. "Pengetahuan tentang Menopause dengan Tingkat Kecemasan pada Wanita Premenopause di Rumah Sakit", Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, 2018 Publication	<1 %
11	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
12	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.unimugo.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.seaninstitute.or.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.aiska-university.ac.id Internet Source	<1 %
17	pdffox.com Internet Source	<1 %
18	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
19	core.ac.uk Internet Source	<1 %
20	repository.stikeselisabethmedan.ac.id Internet Source	<1 %

21

[repository.universitas-bth.ac.id](http://repository.universitas-bth.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

[bimfi.e-journal.id](http://bimfi.e-journal.id)

Internet Source

<1 %

23

Siti Khurata A'yuni, Rijanti Abdurrachim.  
"Tingkat Pemahaman Gizi Dan Dukungan  
Keluarga Terhadap Kepatuhan Diet Penderita  
Diabetes Melitus", Jurnal Riset Pangan dan  
Gizi, 2023

<1 %

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On